


Gol Buffer



گلبار شیمی دانه

بافرهای حقیقی متشکل از یک اسید ضعیف و نمک آن می باشند که در مقابل تغییرات pH مقاومت می کنند. نشخوار کنندگان سیستم پیچیده ای برای تنظیم اسید و باز بدن دارند. اگر pH شکمبه بهینه نباشد، مصرف ماده خشک کاهش می یابد و بروز اسیدوز می تواند سلامتی دام را به خطر انداخته و باعث کاهش تولید پروتئین میکروبی گردد. به علاوه افت pH شکمبه موجب تغییر در جمعیت میکروبی آن شده و سرعت عبور مواد غذایی و هضم ترکیبات الیافی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مراحل ابتلا به اسیدوز تحت بالینی و بالینی




تهران-میدان توحید-خیابان نصرت غربی-بعد از تقاطع خوش-پلاک ۱۱۸-گروه تولیدی بازرگانی گلبار
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۱۰۶۰ فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۳۹۱۰۵

Gol Buffer :
The Next Generation of Buffer

کل بافر (Gol Buffer)

Golbar
Chemi Daneh



Gol Buffer

- قدرت بافری بالا
- بهبود pH شکمبه
- کاهش نفخ و اسهال در گوساله، بره و بزغاله
- بهبود کیفیت شیر
- بهبود لنگش
- حفظ سلامت دام
- کاهش استرس حرارتی
- بهبود عملکرد تولیدی دام

مقدار مصرف:

- گاو شیرده (فصول سرد): ۱۵۰-۲۰۰ گرم به ازای هر رأس دام در روز
- گاو شیرده (فصول گرم): ۲۰۰-۲۵۰ گرم به ازای هر رأس دام در روز
- گوساله پرواری: ۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر رأس دام در روز
- گوسفند و بز شیرده: ۱۰-۲۰ گرم به ازای هر رأس دام در روز
- گوسفند و بز پرواری: ۵-۱۰ گرم به ازای هر رأس دام در روز