



۴۰۰ / ۰۱



گلبار شیمی دانه

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید،  
خیابان نصرت غربی، پلاک ۱۱۸  
تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۶۴۳۱۰۶۰  
بخش پشتیبانی فنی: ۰۲۱-۶۶۱۲۴۸۲۳

کنسانتره ۵ درصد جوجه گوشتی

عقیقی



### آنالیز کنسانتره ۵ درصد جوجه گوشتی عقیق

| ردیف | ماده مؤثره                | واحد    | مقدار |
|------|---------------------------|---------|-------|
| ۱    | انرژی متابولیسمی          | Kcal/Kg | ۱۰۰۰  |
| ۲    | پروتئین خام               | درصد    | ۷/۸۰  |
| ۳    | کلسیم                     | درصد    | ۱۴/۰۰ |
| ۴    | فسفر قابل دسترس           | درصد    | ۵/۹۰  |
| ۵    | سدیم                      | درصد    | ۰/۱۰  |
| ۶    | لیزین قابل هضم            | درصد    | ۱/۴۵  |
| ۷    | متیونین قابل هضم          | درصد    | ۳/۶۰  |
| ۸    | متیونین + سیستین قابل هضم | درصد    | ۳/۸۰  |
| ۹    | ترئونین قابل هضم          | درصد    | ۰/۴۰  |

### اقدام تشکیل دهنده کنسانتره:

- کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، لیزین، متیونین، مکمل های ویتامینه و معدنی، کولین کلراید، آنزیم و سایر افزودنی های مجاز
- آنالیز کنسانتره با در نظر گرفتن ارزش تغذیه ای آنزیم فیتاز ارائه شده و آنالیز آزمایشگاهی با آنالیز فوق متفاوت است .
- کنسانتره تولیدی فاقد نمک ، جوش شیرین و ضد کوکسید یوز است.

### جیره های پیشنهادی کنسانتره ۵ درصد جوجه گوشتی عقیق

| ترکیب مواد خوراکی         | آغازین<br>۰ تا ۱۰ روزگی | رشد<br>۱۱ تا ۲۴ روزگی | پایانی ۱<br>۲۵ تا ۴۱ روزگی | پایانی ۲<br>۴۲ روزگی تا پایان |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| کنسانتره ۵ درصد عقیق      | ۶۰                      | ۵۰                    | ۵۰                         | ۵۰                            |
| ذرت (۷/۸٪)                | ۵۳۰                     | ۵۷۵                   | ۶۲۸                        | ۶۵۵                           |
| کنجاله سویا (۴۲٪)         | ۳۹۲                     | ۳۵۵                   | ۳۰۰                        | ۲۷۰                           |
| روغن گیاهی                | ۹                       | ۱۱                    | ۱۲                         | ۱۶                            |
| صدف معدنی یا کربنات کلسیم | ۵                       | ۵                     | ۵                          | ۵                             |
| نمک                       | ۳                       | ۳                     | ۳                          | ۳                             |
| جوش شیرین                 | ۱                       | ۱                     | ۱                          | ۱                             |
| جمع                       | ۱۰۰۰                    | ۱۰۰۰                  | ۱۰۰۰                       | ۱۰۰۰                          |

توجه:

- ۱- پیشنهاد می شود که ۱۰ روز اول از دان آماده (پیش آغازین و آغازین) استفاده شود.
- ۲- با توجه به شرایط گله می توان برای تنظیم تعادل الکترولیتی بدن پرنده از جوش شیرین استفاده کرد.
- ۳- در صورت سنگین یا شور بودن آب، برای تنظیم مقدار نمک با بخش فنی شرکت گلبار شیمی دانه تماس حاصل نمایید.